

ITEM 290 : ÉPIDÉMIOLOGIE, FDR ET PRÉVENTION DES CANCERS

ÉPIDÉMIOLOGIE EN 2019

- Incidence (2023 = **433 136 cas/an** (57 % chez l'homme, 43 % chez la femme) : stable chez les femmes (↗ cancers du poumon), en diminution chez les hommes ; *estimée à partir des registres départementaux*.

- Mortalité = **157 000 décès/an** : en diminution, 1^{re} cause de mortalité, *estimée à partir du CépiDC-Inserm*.

- Pathologie du sujet âgé : **âge moyen de survenue toutes localisations confondues = 68 ans chez l'homme, 67 ans chez la femme**.

/an	Homme		Femme	
	Cas	Décès	Cas	Décès
TOTAL	210 000	85 000	175 000	67 800
Prostate	59 885	8 100		
Sein			61 214	12 150
Poumon	33 438	22 800	19 339	10 300
Colorectal	26 212	9 200	21 370	7 900

	Fréquence		Mortalité	
Cas général	Prostate > sein > poumon > colorectal		Poumon > colorectal > sein > prostate	
Homme	Prostate > poumon > colorectal > vessie > VADS		Poumon > colorectal > prostate > foie > pancréas	
Femme	Sein > colorectal > poumon > utérus > thyroïde		Sein > poumon > colorectal > pancréas > ovaire	
Variation d'incidence	↗	- Sein (en stabilisation) et prostate : vieillissement de la population. - Poumon, vessie chez la femme : ↗ tabac. - Mélanome : exposition solaire.	↘	- Estomac : meilleure conservation des aliments. - Col de l'utérus : dépistage, vaccination HPV. - VADS, œsophage : ↘ consommation d'alcool.

- Âge : facteur de risque principal.

- FdR majeurs : **tabagisme** (25 % des cancers, 1^{er} facteur de risque évitable), **alcool** (7 %), infection = **VHB, VHC, HPV, Helicobacter pylori, EBV** (4 %).

- FdR mineurs : **exposition professionnelle, obésité, sédentarité** (2 %), **traitement hormonal substitutif ou pilule contraceptive, rayons UV** (1 %), **caractéristiques de la vie reproductive chez la femme** (0,4 %), **polluants** (0,2 %).

Facteurs environnementaux

Tabac

= Principal agent carcinogène : **10 %** de la mortalité annuelle globale, **40 %** de la mortalité par cancer.

- Cancers : . **85 % des cancers du poumon.**
 . **40 % des cancers de vessie et des voies urinaires.**
 . **50-90 % des cancers des VADS.**
 . Autres : **œsophage, estomac, colorectal, foie, pancréas, rein, utérus, sein, ovaire.**

- Agents cancérigènes : **nitrosamine, benzopyrène, goudron...**

- Potentiel cancérigène : selon la **durée** (âge de début), la **dose quotidienne totale** (en paquets-années) et **l'association avec l'alcool** pour certains cancers ; pas de seuil de consommation sans risque ; risque présent avec le tabagisme passif.

- Après arrêt de consommation : **l'incidence rejoint la population non-fumeuse en 10 à 15 ans.**

Alcool

= 9,5 % des décès par cancer, avec une relation dose-effet (en g/j) sans dose seuil.

- Cancers : **VADS, œsophage, estomac, foie, pancréas, colorectal, sein** (1^{er} cancer attribuable à l'alcool en nombre de cas).

- Par irritation chronique (**atrophie muqueuse, hépatite**), ↘ **immunité et carences nutritionnelles.**

Alimenta-tion

= 20-25 % des décès par cancer favorisés par une mauvaise alimentation.

- FdR : . Régime alimentaire hypercalorique, riche en graisse animale : cancer du **sein**, de **prostate**, du **côlon**, de **l'ovaire** et de **l'endomètre**.
 . **Surpoids et obésité** : cancer hormonodépendant chez la femme (**sein, endomètre**).
 . Alimentation trop salée ou riche en nitrosamine et en nitrite : cancer du **pharynx**, de **l'estomac** et de **l'œsophage**.
 . **Viande rouge** : **colorectal**.

- Facteurs protecteurs : alimentation riche en fruits et légumes, en fibres alimentaires, allaitement, activité physique.

FDR	Agents physiques	- Rayons UV (A et B) : cancers cutanés (carcinome spino- et basocellulaire, mélanome)/ - Cancers radio-induits : leucémie, cancer de la thyroïde, cancer du sein, cancer cutané, sarcome...	
	Agents infectieux	= 4 % des décès par cancer, chez des sujets immunodéprimés ou non. - Virus : HTLV (lymphome), EBV (nasopharynx, lymphome de Hodgkin et de Burkitt), VIH (lymphome malin, cancer du col utérin), HHV8 (sarcome de Kaposi), HPV 16-18 (col utérin, cavité buccale, oropharynx, larynx, sphère ano-génitale), VHB et VHC (foie). - Bactérie : Helicobacter pylori (cancer de l'estomac, lymphome gastrique). - Parasite : bilharziose (cancer de vessie épidermoïde).	
	Exposition professionnelle	= 2 % des décès par cancer, 5000 à 8000/an (3 % des cancers incidents/an ; 50 % = poumon) : bâtiment, réparation auto, métallurgie et santé ++. - Amiante (isolation, industrie du verre, centrales thermiques, chantier naval) : plèvre, poumon. - Poussières de bois (menuisier) : adénocarcinome de l'ethmoïde. - Amines aromatiques (peintures, textiles) : vessie. - Rayonnement ionisant (paramédical) : cancer cutané, hémopathie.	
	Facteurs iatrogènes	- Chimiothérapie : cyclophosphamide (cancer de vessie), hémopathie. - Anti-œstrogène (tamoxifène) : cancer de l'endomètre. - Traitements hormonaux substitutifs : faible ↗ du risque de cancer du sein ou de l'endomètre. - Immunosuppresseurs : lymphomes, cancers solides. - Irradiation : leucémie, cancer de la thyroïde, du sein, cutané, sarcome.	
	Pathologie	- MICI (cancer colorectal), cirrhose (CHC), endobrachyœsophage par RGO (ADK de l'œsophage)...	
	Lésion pré-cancéreuse	- Dysplasie (de bas ou haut grade) ou carcinome in situ. - Lésions spécifiques : hyperplasie canalaire atypique (sein), polype adénomateux (colorectal)...	
	Facteurs généraux	- Âge et sexe. - Origine ethnique.	
	Facteurs génétiques	= 10-20 % des cancers, le plus souvent par mutation d'un gène suppresseur de tumeur : - Antécédents familiaux simples (agrégation familiale sans mutation identifiée) : prostate, sein, côlon... - Prédisposition : • Mutation génétique ou anomalie chromosomique identifiée (mutation héréditaire sans expression phénotypique) : BRCA1-2, chromosome Philadelphie. • Syndrome héréditaire prédisposant (manifestations cliniques) : syndrome de Lynch, PAF, maladie de Von-Hippel-Lindau, Xeroderma pigmentosum... → Suspicion de cancer familial héréditaire : consultation d'oncogénétique pour rechercher une mutation génétique (après information et consentement écrit et signé) ± dépistage des apparentés.	
PREVENTION PRIMAIRE		Test génétique	- Par un laboratoire agréé. - Après consultation d'oncogénétique. - Après information et consentement écrit du patient. - Résultat mis en main propre au patient par le médecin, lors d'une consultation.
	Types	- Prévention sélective : prévention en direction d'un sous-groupe de population spécifique (professionnels exposés à des facteurs de risque nécessitant des actions préventives spécifiques et une prévention ciblée), en direction d'un sous-groupe avec des facteurs de risque non modifiables (sd de prédisposition génétique). - Prévention universelle : destinée à l'ensemble de la population quel que soit son état de santé.	
	Lutte anti-tabac	- ↘ Consommation : interdiction de fumer dans les lieux publics, interdiction de la publicité (Loi Veil, Loi Evin). - Opération « Mois sans tabac ». - Site « Tabac Info Service ». - Restriction de la vente : ↗ des prix, interdiction de vente aux mineurs. - Action de sensibilisation : campagnes d'information, avertissement sur les paquets. - Aide au sevrage : conseil minimal d'arrêt du tabac, cs anti-tabac, substituts nicotiniques, médicaments (forfait d'aide au sevrage de 150 euros/an). - Cigarette électronique.	
	Lutte anti-alcool	- ↘ Consommation : publicité contrôlée. - Action de sensibilisation : campagnes médiatiques, rappel des risques sur les bouteilles. - Consultation d'addictologie et aide au sevrage.	

PREVENTION PRIMAIRE	Plan National Nutrition-Santé		- Stabiliser l'obésité et ↘ surpoids chez l'adulte, ↘ obésité et surpoids chez l'enfant. - ↗ L'activité physique et ↘ la sédentarité à tout âge. - Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels : ↗ consommation de fruits et légumes (5/jr), lutte contre la carence en calcium et en fer, promotion de l'allaitement maternel. - Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles : dénutrition, troubles du comportement.		
	Lutte contre l'exposition solaire		- Information sur les dangers de l'exposition excessive (bronzage naturel, lampe UV). - Éducation sur les mesures de protection solaire, surtout chez les enfants.		
	Lutte contre l'exposition professionnelle		= Rôle du médecin du travail : interdiction/limitation de certaines substances, mesures de protection individuelle et collective, mesures de l'exposition.		
	Lutte contre les agents infectieux		- Sensibilisation sur les IST. - Vaccination contre HPV (Gardasil®) : jeunes filles de à partir de 11 ans ; garçons entre 11 et 14 ans révolus (2 doses), rattrapage entre 15 et 19 ans (3 doses) ; GARDASIL 9 → prévention des lésions pré-cancéreuses, cancers et verrues génitales. - Vaccination contre l'hépatite B (obligatoire).		
DEPISTAGE	= Prévention secondaire : dépistage des cancers au stade infra-clinique pour proposer un traitement précoce. - Dépistage systématique (le plus exhaustif possible : test de Guthrie...) : aucun exemple en cancérologie. - Dépistage de masse = organisé : proposé à l'ensemble de la population à risque (selon un critère d'âge) = action de santé publique, prise en charge à 100 %. - Dépistage individuel = opportuniste : réalisé chez un individu présentant des facteurs de risque personnels, à l'initiative du médecin et du patient, sans prise en charge à 100 %. → Diminuer la prévalence d'une maladie dans une population : toute action mise en œuvre pour prendre en charge la maladie précocement avant tout signe clinique (dépistages, soins précoces).				
	Critères OMS		Maladie	Population	Test de dépistage
			- Problème de santé publique (fréquent, grave). - Histoire naturelle connue. - Évolution lente, signes tardifs. - Traitement existant. - Pronostic amélioré par un TTT précoce.	- Population cible identifiée et sensibilisée. - Accès aux moyens diagnostiques et thérapeutiques.	- Valide (sensibilité) et reproductible. - Acceptable par la population. - Coût supportable.
	Biais		Avance au diagnostic	Évolutivité	Sur-diagnostic
			Diagnostic plus précoce sans retardement du décès.	Dépistage préférentiel des tumeurs d'évolution plus lente.	Dépistage de tumeurs indolentes, non responsables du décès du patient.
Dépistage de masse	Cancer du sein	= Examen clinique et mammographie bilatérale tous les 2 ans, avec 2 incidences et double lecture des clichés (par radiologue agréé), pour toutes les femmes de 50 à 74 ans sans autre facteur de risque que l'âge. - Proposé à 9 millions de femmes : 50 % de participation. - 16 000 cancers détectés/an (dont 6 % à la 2^{de} lecture) = 7 cancers/1000 mammographies. - ↘ La mortalité par cancer du sein de 20 % (sans efficacité sur la mortalité globale) - FdR : ménarche précoce (< 12 ans), ménopause tardive (> 55 ans), première grossesse tardive (> 30 ans), pauciparité/nulliparité, absence d'allaitement, contraception œstroprogestative, traitement hormonal substitutif de la ménopause, antécédents médicaux (antécédents de carcinome in situ ou d'hyperplasie atypique, radiothérapie thoracique antérieure, antécédents personnels de cancer du sein), mode de vie (obésité, consommation d'alcool, sédentarité, haut niveau socio-économique, exposition prolongée aux traitements hormonaux).			
	Cancer colorectal	= Recherche de sang occulte dans les selles tous les 2 ans, par test immunologique, pour toutes les personnes de 50 à 74 ans à risque moyen, sans symptômes évocateurs. - Proposé à 17 millions de personnes : 30 % de participation. - 8500 cancers détectés/an (+ polypes et adénomes), ↘ la mortalité de 15 %.			

DEPISTAGE	Dépistage de masse	Cancer du col de l'utérus	= Frottis cervico-vaginal lors de la consultation gynécologique : - Entre 25 et 29 ans révolus : examen cytologique tous les 3 ans, après 2 frottis négatifs à 1 an d'intervalle. - Entre 30 et 65 ans révolus : test HPV (frottis, alternative = auto-prélèvement vaginal) tous les 5 ans. - La vaccination ne sursoit pas au dépistage. - FdR : infection par les HPV oncogènes (notamment HPV 16 et 18), tabac, immunodépression, autres infections sexuellement transmissibles, âge précoce du premier rapport sexuel, multiples partenaires sexuels au cours de la vie, nombre élevé de grossesses, bas niveau socio-économique, faible niveau d'éducation, contraception orale.
		Cancer de la prostate	- Dépistage systématique non recommandé par les autorités sanitaires. - Information sur la démarche et ses conséquences pour tout patient souhaitant réaliser un dosage de PSA. - Si dépistage réalisé, TR + PSA annuel, chez tous les hommes de > 50 ans (ou > 45 ans si à risque).
		Poumon	- Non recommandé au 1 ^{er} janvier 2021, même chez les patients fumeurs par les autorités de santé.
		Mélanome	= Examen cutané annuel par un dermatologue et apprentissage de l'auto-surveillance. - Campagne de dépistage gratuit annuelle : 14 000 personnes examinées, 170 cancers.